

Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин
по Республике Башкортостан за январь -декабрь 2017 г.

№ п/п	Ключевые (сигнальные) индикаторы	Рекомендованные значения	Показатель за январь – декабрь 2017	Показатель за январь – ноябрь 2017	Показатель за январь - ноябрь 2017г. по РФ
1	Доля больных с острым коронарным синдромом с подъёмом сегмента ST, которым выполнен тромболитис (на догоспитальном и госпитальном этапах)	не менее 25%	28,59	28,55	26,50%
2	Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	30-35%	29,58	30,05	26,60%
3	Доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах субъекта от общего количества выбывших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом	менее 20%	14,92	14,66	19,00%
4	Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением	не менее 35 %	34,44	32,69	35,80%
5	Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания	не менее 40 %	35,82	35,5	33,90%
6	Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболитис	не менее 5%	3,55	3,63	3,50%
7	Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации.	менее 25%	27,72	28,63	34,20%
8	Доля населения субъекта Российской Федерации вакцинированный против гриппа	30% на конец 2017 г.	41,86	41,7	41,60%
9	Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированных во все стационары субъекта РФ.	не менее 82%	70,11	71,74	79,30%
10	Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)	не менее 55,5%	50,67	51,18	55,20%
11	Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте с ЗНО	не менее 90%	95,08	95,87	89,50%
12	Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской помощи	не менее 75%	85,21	80,89	76,50%
13	Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 2015г. для плана 2017г.)	не менее 60%	60,27	60,27	56,10%
14	Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения.	не менее 95%	97,18	96,69	97,00%
15	Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	не менее 95%	95,13	90,18	90,40%
16	Доля больных с ЗНО, выявленных активно	не менее 23,5%	19,02	16,17	25,30%
17	Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа впервые в жизни установленным диагнозом болезней печени и поджелудочной железы	не менее 70%	87,75	79,92	74,60%
18	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	не менее 95%	96,22	96,13	95,70%
19	Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	не менее 85%	99,38	91,71	89,60%