

Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин
по Республике Башкортостан за январь - декабрь 2019 г.

№ п/п	Ключевые (сигнальные) индикаторы	Рекомендованные значения	Показатель за январь-декабрь 2019	Показатель за январь-ноябрь 2019	Показатель за январь-ноябрь 2019г. по РФ
1	Доля больных с острым коронарным синдромом с подъёмом сегмента ST, которым выполнен тромболитизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)	не менее 25%	25,48	26,58	26,0%
2	Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	30-35%	53,28	52,79	37,6%
3	Доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах субъекта от общего количества выбывших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом	менее 20%	15,72	15,67	18,5%
4	Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением	не менее 35 %	38,74	33,75	37,6%
5	Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания	не менее 40 %	39,34	38,67	33,6%
6	Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболитизис	не менее 5%	6,71	6,95	4,8%
7	Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации.	менее 25%	30,36	29,34	37,6%
8	Доля населения субъекта Российской Федерации вакцинированный против гриппа	30% на конец 2019 г.	46,33	38,31	42,5%
9	Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированных во все стационары субъекта РФ.	не менее 82%	73,16	74,3	83,1%
10	Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)	не менее 55,5%	52,61	53,13	57,4%
11	Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте с ЗНО	не менее 90%	90,84	90,7	92,1%
12	Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской помощи	не менее 75%	84,23	86,81	77,8%
13	Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 2015г. для плана 2017г.)	не менее 60%	63,97	63,97	56,3%
14	Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения.	не менее 95%	98,84	98,76	97,6%
15	Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	не менее 95%	96,0	95,1	93,3%
16	Доля больных с ЗНО, выявленных активно	не менее 23,5%	25,63	21,9	26,9%
17	Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа впервые в жизни установленным диагнозом болезней печени и поджелудочной железы	не менее 70%	90,2	91,05	77,6%
18	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	не менее 95%	95,76	96,4	96,4%
19	Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	не менее 85%	97,72	98,9	92,4%

Из 19 показателей за январь-декабрь 2019 года:

Рекомендованных значений не достигли 4 показателя (это: 5-ый, 7-ой, 9-ый и 10-ый индикаторные показатели)

Рекомендованных значений достигли 15 индикаторных показателя (это 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 6-ой, 8-ой, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый, 18-ый, 19-ый индикаторные показатели).